

بچے کے کان میں انفیکشن ہو تو والدین کیا کریں



چھوٹے بچوں میں ہونیوالی کان کے انفیکشن کی وجہ عموماً وائرس یا بیکٹیریا ہوتے ہیں۔

انفیکشن کی بیشتر اقسام 2-3 روز میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔

تاہم، یہ ساری فیملی کو پریشان ضرور کر دیتی ہے۔




بچوں میں عمومی علامات

- ہلکا بخار ہو سکتا ہے (39 ڈگری یا اس سے کم)
- کان میں درد ہو سکتا ہے
- سونے یا کھانا کھانے میں مشکل ہو سکتی ہے
- یا وہ روتے رہتے ہیں یا "موڈ خراب" رہتا ہے



آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

- اپنے بچے کو بچوں کیل پول یا ڈولر (Calpol/Dolar) سیرپ دیں (درد اور بخار دونوں کے لیے)
- بچے کے کان کے نیچے گرم پیک رکھیں
- کان کو حرارت دیں



اگر بچے کی حالت میں 48 گھنٹوں کے اندر بہتری نہیں آتی یا بخار 39 ڈگری سے زیادہ ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں۔

آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

اگر آپ کے بچے میں یہ شدید علامات پائی جاتی ہیں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر یا ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ میں جائیں۔

شدید علامات

- کان سے صاف مادہ یا پیپ نکلنا
- کپکپی ہونا
- کان کے پیچھے سوجن یا سرخی نمودار ہونا
- بچہ دودھ نہ پیئے یا کھانا نہ کھائے
- بچہ قے کر دے

اینٹی بائیوٹیک

ڈاکٹر اینٹی بائیوٹیک بھی تجویز کر سکتا ہے۔
اینٹی بائیوٹیک ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کریں۔

